

MISSION ROHAN-CHABOT DANS L'ANGOLA ET DANS LA RHODÉSIA (1914).

DESCRIPTIONS DE CURCULIONIDES NOUVEAUX,

PAR M. A. HUSTACHE.

(2<sup>e</sup> Note.)

---

GENRE **Bagous** Schoenherr.

**Bagous pilitarsis** nov. sp.

Allongé, revêtu de squamules serrées brunâtres, les antennes et les tarses ferrugineux.

Rostre plus court que le prothorax, épais, peu arqué, arrondi, obliquement déprimé de l'insertion antennaire au sommet, revêtu de squamules très serrées et beaucoup plus petites que celles de la tête; tête peu convexe, le front marqué d'une grande et profonde fovéole, les bords brièvement et peu fortement relevés contre les yeux, ces derniers presque plans. Antennes insérées vers le tiers apical du rostre, le scape arqué atteignant l'œil, le funicule mince, les deux premiers articles allongés, ensemble plus longs que le reste du funicule, les articles suivants très petits et très serrés, la massue courte, grosse, ovale, en entier densément pubescente.

Prothorax subcylindrique, plus long que large, peu rétréci, largement mais peu profondément étranglé en avant, les côtés peu arqués dans le milieu, sinués dans les angles postérieurs, le disque peu convexe, inégal, marqué d'une large et profonde impression au milieu de la base, la ponctuation fine et très serrée. Écusson assez grand, arrondi, plan.

Élytres allongés, plus larges et plus de trois fois aussi longs que le prothorax, les épaules très obliques, longuement rétrécis-acuminés dans leur tiers apical, le disque plan, la déclivité postérieure oblique; stries fines, peu distinctement ponctuées; interstries larges, plans, finement et densément granulés, les granules ponctués dans leur centre, la suture convexe en arrière, le 3<sup>e</sup> interstrie muni au sommet de la déclivité postérieure d'une petite élévation teintée de clair, réuni au sommet avec le 9<sup>e</sup>, leur jonction relevée en carène, le 5<sup>e</sup> interstrie indistinctement calleux à son sommet, mais l'impression postérieure forte, le 4<sup>e</sup> interstrie sensiblement rétréci à sa base.

Pattes élançées, les tibias armés d'un fort ongle apical; tarsi allongés, les antérieurs munis en dessous de longs poils; 1<sup>er</sup> article conique, du triple aussi long que large aux 4 tarsi postérieurs, un peu moins long et plus épais aux antérieurs, le 2<sup>e</sup> article aussi large mais beaucoup plus court, le 3<sup>e</sup> entier, beaucoup plus large que le 2<sup>e</sup>, cordiforme aux antérieurs, un peu plus étroit aux postérieurs, le 4<sup>e</sup> étroit, indistinctement plus long que le 3<sup>e</sup>, les ongles petits.

Long., 6 millimètres.

Angola : District de Huilla, Mucoia, 1914, un seul exemplaire probablement mâle.

**Bagous angolensis nov. sp.**

Oblong, brun noir, revêtu de squamules mélangées brunes et grises.

Rostre aussi long que le prothorax, épais, arqué, muni de chaque côté, devant l'œil, d'un fort sillon, squamulé à la base, les squamules plus fines vers le sommet, la ponctuation et la sculpture voilées. Tête convexe, le front légèrement déprimé, densément squamulée, le vertex à squamules plus petites, rondes, moins serrées. Antennes courtes, ferrugineuses, la massue grosse, ovale, foncée.

Prothorax aussi long que large, subcylindrique, à peine plus étroit en avant qu'à la base, les lobes oculaires très forts, le disque inégal, impressionné largement en avant particulièrement sur les côtés, et marqué au milieu de sa base d'une impression grande et profonde; finement ponctué-granulé, plus foncé dans le milieu, les côtés à revêtement jaunâtre. Écusson punctiforme.

Élytres beaucoup plus larges que le prothorax, subrectangulaires; brusquement rétrécis en arrière, largement arrondis ensemble au sommet; convexes sur le disque, brusquement déclives au sommet; stries fines, indistinctement ponctuées; suture et interstries 3, 5, 7 relevés, plus fortement et costiformes en arrière, le 3<sup>e</sup> derrière la base relevé en un calus faible, au sommet épaissi et relevé en un fort calus, le 5<sup>e</sup> muni vers son milieu de quelques petites nodosités, son sommet relevé en une très forte gibbosité; revêtement jaunâtre, le sommet des nodosités et des calus blancs.

Pattes robustes et assez élançées; fémurs fortement claviformes; tibias fortement arqués en dedans vers le sommet, leur ongle apical robuste; tarsi assez étroits, ferrugineux, presque glabres en dessus, soyeux, leur pubescence dense en dessous, le 2<sup>e</sup> article oblong, le 3<sup>e</sup> beaucoup plus large et plus long que le 2<sup>e</sup>, subcordiforme, à peine échancré au sommet.

Long., 4 millimètres.

Angola : district de Huilla, Lumuna-Loenguë, 1914. Un exemplaire.

**TRIGONOCOLINI.**

GENRE **Trigonocolus** Lacordaire, Genera, VI, p. 593.

*Megarhinus* Schoenherr, Gen. Curc., III, p. 397.

**Trigonocolus amplicolis** nov. sp.

Noir, peu brillant, revêtu d'une pubescence cendrée, très fine, éparse, peu visible en dessus, courte mais serrée en dessous.

Rostre aussi long que le prothorax, arqué, légèrement comprimé latéralement à la base, un peu élargi en avant de l'insertion antennaire, à ponctuation serrée, ruguleuse, la carène médiane fine, peu tranchante. Tête convexe, légèrement déprimée transversalement derrière les yeux, ponctuée comme le rostre, presque glabre en dessus, revêtue autour des yeux et derrière ceux-ci de petites squamules blanches et assez serrées. Antennes courtes, épaisses; scape brusquement épaissi au sommet, glabre, mais muni en dessous d'une ligne de pubescence courte; funicule à pubescence sétiforme cendrée, serrée, le 1<sup>er</sup> article conique, peu plus long que large, le 2<sup>e</sup> plus court que le 1<sup>er</sup> conique et moins long que large, les suivants fortement transversaux, serrés, graduellement élargis, la massue à peine plus courte que le funicule, oblongue-fusiforme, à pubescence fine, appliquée, brune.

Prothorax un peu moins long que large à la base, fortement rétréci et tubuleux en avant, les côtés très fortement dilatés arrondis dans leur tiers postérieur; couvert de rugosités obliquement dirigées vers le milieu. Écusson grand, cordiforme, impressionné dans le milieu, ponctué-ruguleux en avant, lisse en arrière.

Élytres triangulaires, pas plus larges que le prothorax, graduellement déclives en arrière dès le tiers antérieur, les stries assez fortes et ponctuées, les interstries dorsaux subplans, les latéraux convexes et carénés, la suture légèrement tectiforme, le 4<sup>e</sup> légèrement gibbeux au sommet; disque transversalement déprimé derrière la base, et aussi longitudinalement le long de la suture; couvert de rugosités transversales serrées. Pygidium vertical, rugueux et pubescent.

Pattes robustes et densément pubescentes de cendré, les antérieures plus longues; fémurs sublinéaires, armés d'une forte dent aiguë, leur pubescence formée par des squamules bi ou trifides, fendues jusqu'à la base; tibias rugueux, leur pubescence sétiforme, simple, tous comprimés, les antérieurs anguleusement dilatés vers leur tiers basal interne, armés au sommet d'une dent obtuse externe et de deux ongllets apicaux internes, le terminal fort, l'autre petit; tibias intermédiaires conformés comme les antérieurs mais les ongllets apicaux moins forts; tibias postérieurs graduel-

lement et fortement élargis de la base au sommet, le bord interne non sinué, armés au sommet d'un petit onglet apical interne; tarses robustes, spongieux de blanc en dessous. Ongles appendiculés.

Dessous ponctué-granulé, le milieu revêtu d'une pollinosité jaune, les bords à pubescence cendrée, simple sur l'abdomen, formée sur la poitrine de squamules laciniées.

Long., 7 millimètres environ.

Angola : Rivière Cubia, juillet 1914. Un seul spécimen.

### TICHIINI.

GENRE *Tychius* Schöenherr.

*Tychius Chaboti* nov. sp.

Noir, les antennes et les tarses ferrugineux, le prothorax orné de trois taches sur la base et d'une linéole sur le bord antérieur blanches, les élytres revêtues de squamules ovales, grandes, concaves, partiellement imbriquées, brunes, jaunâtres et blanchâtres, ces dernières formant une tache allongée peu nette sur l'épaule, le bord latéral d'un brun foncé, la poitrine et l'abdomen revêtus d'une couche compacte de squamules crétaées.

Rostre un peu plus court que le prothorax, droit, graduellement aminci de la base au sommet (vu de dessus et aussi de profil), densément couvert de squamules brunes jusqu'à l'insertion antennaire, le sommet dénudé et ferrugineux. Tête petite, squamulée comme le rostre, le front légèrement déprimé, les yeux grands, peu saillants, entourés d'un liséré de squamules plus claires. Antennes insérées vers le milieu du rostre, éparsément ciliées, ferrugineuses, la massue foncée.

Prothorax aussi long que large à la base, rétréci en avant, les côtés modérément arqués, le disque à ponctuation superficielle et rugueuse. Écusson arrondi, squamulé de blanc.

Élytres subparallèles jusqu'au tiers apical, les stries fines, ponctuées, les points pourvus chacun d'un fin poil blanc, les interstries larges et faiblement convexes en avant, la suture élargie et fortement relevée en arrière, les interstries impairs relevés à leur sommet.

Fémurs inermes couverts, de grandes squamules blanchâtres et jaunâtres, les tibias de squamules beaucoup plus petites; tibias antérieurs légèrement bisinué et brièvement pubescents sur leur tranche interne, les postérieurs légèrement arqués en dehors. Ongles dentés.

Milieu du prosternum et un anneau autour des hanches antérieurs blancs, le reste foncé, la poitrine et l'abdomen crétacés.

Long., 3,5 millimètres.

Angola : de Dongo au Cubango, Benguela, 1914. Un exemplaire.

### **APODERINI.**

GENRE **Apoderus** Olivier.

#### **Apoderus lagenoderoides** nov. sp.

Brun rouge, mat, revêtu d'une dense pubescence soyeuse et brillante, courte et appliquée.

Tête étroite, cylindrique, au moins aussi longue que le prothorax, le front légèrement déprimé et finement caréné, les yeux ronds, grands, semi-globuleux. Rostre moitié aussi long que la tête, fortement élargi en avant, rugueux et pubescent comme la tête. Antennes ferrugineuses, robustes et courtes, les articles du funicule grossissant graduellement, le 7° fortement transversal, aussi large que la massue et contigu à cette dernière, la massue oblongue, courte.

Prothorax un peu moins long que large à la base, les côtés peu arqués, brusquement rétrécis-arrondis en avant, la base bisinuée; modérément convexe, muni au milieu d'un sillon longitudinal fin et profond.

Écusson très grand, impressionné et sillonné au milieu, pubescent.

Élytres rectangulaires, légèrement sinués derrière les épaules, largement et assez profondément impressionnés transversalement derrière la base, les stries et la ponctuation indistinctes, munis chacun de trois fines carènes un peu plus élevées vers la base.

Pattes courtes, robustes, pubescentes; fémurs fortement épaissis, armés d'une assez forte dent triangulaire, placée en dessous non loin du genou; tibias carénés et sillonnés sur leur tranche externe, dilatés et crénelés sur leur tranche interne, particulièrement les antérieurs, munis au sommet de deux forts ongles; tarses robustes et courts, le 2° article large et transversal, le 3° fortement bilobé, les ongles parallèles et connés à la base.

Dessous ponctué et pubescent.

Long., 5,2 millimètres.

Angola : district de Huilla, passage de la Longa, 1914. Un exemplaire type.

Congo Belge : Elisabethville, Kapiri (Musée de Tervueren).

Les spécimens du Congo belge sont en général plus grands et atteignent jusqu'à 7,5 millimètres.

Le milieu des fémurs, du prothorax, de la tête, les bords des élytres sont plus ou moins rembrunis; la moitié postérieure des élytres est parfois aussi plus foncée que la partie antérieure.

Singulière espèce qui rappelle à première vue les *Lagenoderus* White de Madagascar, mais chez laquelle c'est non le prothorax mais la tête qui est allongée.

**Ocladius rubriventris** nov. sp.

Brillant, les élytres d'un noir à léger reflet cuivreux, le prothorax et les pattes d'un ferrugineux foncé, muni en dessus de poils blancs fins arqués, soulevés, très épars, un peu plus nombreux et plus longs sur le prothorax.

Rostre peu épais, plus long que la tête et le prothorax, modérément arqué, tricaréné et sillonné, les sillons ponctués, les points brièvement sétosulés, brillant; noirâtre à la base, presque lisse, pourvu seulement d'une rangée latérale de points, rouge ferrugineux au sommet. Tête noire, grossièrement ponctuée et sétosulée. Antennes allongées, rouges, à pubescence longue mais peu dense; 2<sup>e</sup> article du funicule plus long que le 1<sup>er</sup>, les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> cylindriques, plus du double aussi longs que larges, la massue ovale-oblongue de la longueur des trois articles précédents ensemble.

Prothorax transversal, globuleux, le bord antérieur brièvement marginé de jaune; couvert de profonds sillons irréguliers.

Élytres lisses, brillants, pourvus çà et là de petits points d'où émergent les poils blancs, la suture relevée dans son quart basal.

Pattes couvertes de soies raides, blanches et alignées; fémurs inermes, fortement multistriés et carénés; tibias droits, leur tranche externe carénée, leurs faces interne et externe finement sillonnées et carénées, leur pubescence apicale fine, serrée, jaune.

Dessous ferrugineux, brillant, la ponctuation superficielle et éparse, plus profonde et plus serrée sur le segment anal, la pubescence assez longue mais très éparse.

Long., 3,7 millimètres.

Angola : Benguela, Capelongo-Dongo, décembre 1914. Un spécimen.